



DESTONE POWDER

Preparat w proszku do odkamieniania ekspresów, czajników i innych urządzeń i powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

Preparat w proszku do odkamieniania ekspresów, czajników i wszelkich powierzchni i urządzeń odpornych na działanie kwasów.

WŁAŚCIWOŚCI:

Środek do usuwania osadów mineralnych gromadzących się w trakcie eksploatacji. Zalecany do zmywarek gastronomicznych oraz domowych, ekspresów, czajników, wyparzarek, bojlerów, grzałek elektrycznych, kotłów, parowników, nagrzewnic oraz wszelkich zakamienionych urządzeń.

DOZOWANIE:

100g preparatu rozpuścić w 1 litrze ciepłej wody ok. 50°C. Roztwór wlać do czyszczonego urządzenia i pozostawić do odkamieniania. Preparat wylać, a urządzenie starannie wypłukać wodą. W przypadku zmywarek wsypać 50 – 200g do komory z wodą i uruchomić zmywarę.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Kolor: biały proszek lub kryształki.
Stan skupienia: ciało stałe.
Wartość pH: dla 1% roztworu 2-3

SKŁAD:

Kwas amidosulfonowy.

KLASYFIKACJA:

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnym pojemniku, szczelnie zamkniętym, z dala od promieni słonecznych, w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie trzymać w pobliżu żywności i napojów.

UWAGI OSTRZEGAWCZE:

Uwaga! Zawiera kwas amidosulfonowy
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H318 – Działa drażniąco na oczy.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; kat. przewlekła 3

KONTAKT Z SKÓRĄ: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku poparzenia nałożyć jałowy opatrunek. Zanieczyszczoną skórę zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Nie stosować mydła i żadnych środków zobojętniających. Wymagana pomoc lekarza.

KONTAKT Z OCZAMI: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody, usunąć szkła kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez ok. 15 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. Po przemyciu nałożyć na oczy jałowy opatrunek bez żadnych leków i zwalczać ból lekami przeciwbólowymi. Koniecznie wezwać pomoc medyczną.

POŁKNIECIE: Natychmiast zapewnić pomoc medyczną. NIE prowokować wymiotów –niebezpieczeństwo aspiracji do płuc. Nie podawać nic do picia w przypadku podejrzenia perforacji układu pokarmowego. Zapobiec utracie przytomności u poszkodowanego. W przypadku wystąpienia naturalnych odruchowych wymiotów trzymać poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu. W przypadku wystąpienia duszności podawać tlen do oddychania.