



TOILET DESTONER

Zagęszczony preparat czyszczący do mycia toalet, pisuarów oraz ceramicznych urządzeń sanitarnych. Usuwa najmocniej przywarty kilku letni kamień i rdzawe zacieki.

ZASTOSOWANIE:

Zagęszczony preparat czyszczący odkamieniający do mycia: toalet, pisuarów, wanien, brodzików. Usuwa najbardziej przywarty, nawet kilku letni kamień i rdzę. Preparat do stosowania okresowego.

WŁAŚCIWOŚCI:

TOILET DESTONER jest płynnym wysokolepkim, kwaśnym środkiem usuwającym rdzę, kamień wodny i osady wapienne.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść stężony preparat na toaletę itd. Odczekać 15 minut. Wyczyszczone powierzchnie spłukać dużą ilością wody. Preparatu nie stosować na powierzchniach nie odpornych na działanie kwasów. Zawsze przed użyciem zaleca się przeprowadzenie próby w miejscu nie widocznym.

WŁAŚCIWOŚCI

FIZYKO-CHEMICZNE:

Kolor: żółta lub brązowa lepka ciecz
Stan skupienia: ciecz
Wartość pH: dla 1% roztworu 1
Gęstość: ok. 1,1 g/cm³ (w temperaturze 20°C)

SKŁAD:

5-15% Kwas chlorowodorowy, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne

KLASYFIKACJA:

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnym pojemniku, szczelnie zamkniętym, z dala od promieni słonecznych, w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie trzymać w pobliżu żywności i napojów.

UWAGI

OSTRZEGAWCZE:

Produkt żrący. Zawiera kwas chlorowodorowy
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H290 - Może powodować korozję metali.

KONTAKT Z SKÓRĄ: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku poparzenia nałożyć jałowy opatrunek. Zanieczyszczoną skórę zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Nie stosować mydła i żadnych środków zobojętniających. Wymagana pomoc lekarza.

KONTAKT Z OCZAMI: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody, usunąć szkła kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez ok. 15 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. Po przemyciu nałożyć na oczy jałowy opatrunek bez żadnych leków i zwalczać ból lekami przeciwbólowymi. Koniecznie wezwać pomoc medyczną.

POŁKNIĘCIE: Natychmiast zapewnić pomoc medyczną. NIE prowokować wymiotów –niebezpieczeństwo aspiracji do płuc. Nie podawać nic do picia w przypadku podejrzenia perforacji układu pokarmowego. Zapobiec utracie przytomności u poszkodowanego. W przypadku wystąpienia naturalnych odruchowych wymiotów trzymać poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu. W przypadku wystąpienia duszności podawać tlen do oddychania.